

診療科:肝胆膵内科 原三信病院 がん化学療法プロトコール一覧
 がん腫:膵・胆管・肝がん

2026年4月1日現在

プロトコール名	抗がん剤 (一般名)	投与量	投与時間	投与日	1コース 期間	支持療法(一般名) 1日量 ※副作用に対する薬剤です	備考
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8・15	28日間	d1 ラモセトロンOD錠0.1mg	※生食希釈板、ブドウ糖希釈板あり
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分点滴	d1	14日間	d1 ジフェンヒドラミン錠50mg	
	レボホリナート	200mg/m ²	120分点滴	d1		d1 ファモチジンOD錠20mg	
	イリノテガン	180mg/m ²	90分点滴	d1		d1-4 デキサメサゾン錠8mg	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分点滴	d1		d1-3 アプレビタント錠[d1:125mg d2・3:80mg]	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間点滴	d1-2			
アブラキサン+GEM	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	30分点滴	d1・8・15	28日間	d1 バロノセトロン注0.75mg	
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8・15		d1 デキサメサゾン注6.6mg d2・3 デキサメサゾン錠8mg d9・10 d16・17	
TS-1+GEM(4週1クール)	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25ml未満 →80mg/day 1.25ml~1.5ml未満 →100mg/day 1.5ml以上 →120mg/day	1日2回朝・夕食後	d1タ-15朝投薬 d15タ-29朝休業	28日間	d1・15 ラモセトロンOD錠0.1mg	
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・d15			
TS-1+GEM(3週1クール)	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25ml未満 →60~80mg/day 1.25ml~1.5ml未満 →100mg/day 1.5ml以上 →120mg/day	1日2回朝・夕食後	d1タ-15朝投薬 d15タ-22朝休業	21日間	d1.8 ラモセトロンOD錠0.1mg	※最低投与量は添付文書80mg/日 だが1.25ml未満は60mg/日(朝 40mg、夕20mg)で投与可
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8			
GEM+CDDP	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8	21日間	d1・8 グラニセトロン注3mg d1・8 デキサメサゾン錠4mg d1・8 マニトール注20% 300mL	
	シスプラチン	25mg/m ²	120分点滴	d1・8		d1-3 アプレビタント錠[d1:125mg d2・3:80mg] d8-10 アプレビタント錠[d8:125mg d9・10:80mg]	
イミフィンジ(胆道) GEM+CDDP併用	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	d1	21日間		
イミフィンジ(胆道)単独	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	d1	28日間		
サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	初回60分 2回目以降30分点滴	d1	14日間	d1 ジフェンヒドラミン錠50mg	
オブジーボ+ヤーボイ(肝)	ニボルマブ	80mg/body	初回60分 2回目以降30分点滴	d1	21日間		
	イピリムマブ	3mg/kg	30分点滴	d1			
オブジーボ(肝)2週毎	ニボルマブ	240mg/body	初回60分 2回目以降30分点滴	d1	14日間		
オブジーボ(肝)4週毎	ニボルマブ	480mg/body	初回60分 2回目以降30分点滴	d1	28日間		